



BREXIL Ca

5 Kg

net mass, 을 중량, 1кгнетто, nettogewicht, 淨重, net kütlvi, нето маса, netto gewicht

ENGLISH | FOLIAR APPLICATIONS OF BREXIL Ca PREVENT AND CURE CALCIUM DEFICIENCY.

The complexing agent LSA optimizes calcium uptake without any risk of phytotoxicity.
DIRECTIONS OF USE: TIMING AND RATE OF APPLICATION: Foliar application (treatment every 7-14 days): Fruit: 2.5-3 kg/ha; Vegetable crops: 2.5-3 kg/ha; Industrial crops: 2.5-3 kg/ha; VINES 2.5-3kg/ha Ornamental crops: 250-300 g/100 l.
CAUTION: A mixibility test is suggested before mixing BREXIL Ca with products or formulas containing Phosphorous or Sulphur.

COMPLEXED CALCIUM (AMMONIUM LIGNINSULPHONATE) WITH BORON (B)

COMPOSITION: Calcium oxide (CaO) water soluble 20.0%; Calcium oxide (CaO) LSA complexed 20.0 %; Boron (B) water soluble 0.5%. Calcium complexed with LSA is stable between the range of pH 3-9, pH 1%: 6.5
FORMULATION: soluble microgranules.

Manufacturer: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le - 66041 ATESSA (Chieti) Italy
Distributed in New Zealand by: AGRITRADE AGRITRADE, 1 Robin Mann Place
Christchurch Airport Christchurch 8053 - New Zealand
Telephone (03) 341 4587 - Fax (03) 341 4584 / Free Phone 0 800 333 855
Distributed in Australia: Campbells Fertilisers Australasia P/L
18 Raymond Rd Laverton Nth. Melbourne, Victoria, Australia.
3026. Phone: +613 9931 2211 Fax: +613 9931 2201
Email: info@campbellsfert.com.au Web: www.campbellsfert.com.au

DEUTSCH | Brexil Ca behebt und beugt Calciummangel vor. Der komplexierte Wirkstoff (LSA) gewährleistet bei die maximale Eindringung und Nutzung des Calziums ohne jegliches Phytotoxizitätsrisiko.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG: blattpflanzen (tägliche Anwendung für 7-14 Tage), Obstpflanzen: 2,5-3,0 kg/ha; Gemüsepflanzen: 2,5-3,0 kg/ha; Industripflanzen: 2,5-3,0 kg/ha; Zierpflanzen: 250-300 g/100l.
HINWEISE: nicht mit schwefelhaltigen Produkten mischen.

CALCIUMDÜNGER – KOMPLEXIERTES CALCIUM MIT LSA, MIT BOR (B)
ZUSAMMENSETZUNG: wasserlösliches calciumoxid (CaO): 20,0%; calciumoxid (CaO) komplexiert mit LSA: 20,0%; wasserlösliches Bor (B): 0,5%. komplexierter calcium mit LSA ist im pH-Intervall 3-9 stabil.
FORMULIERUNG: lösliche Mikrokristalle.
Nur im echten Bedarfsfall verwenden. Nicht überdosieren.

Produzierte und packte durch Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atezza (Chieti) Italy

NEDERLANDS | Brexil Ca voorkomt en geneest calciumgebrek . Het complexvormende middel LSA, geeft gegarandeerd de maximale doordringing en opname van calcium, zonder enkel risico voor plantvergiftiging.
DOSISSEN EN GEBRUIKSAANWIJZING: Op bladen (toediening om de 7-14 dagen). Fruitgewassen: 2,5-3,0 kg/ha; groente: 2,5-3,0 kg/ha; Industriële gewassen: 2,5-3,0 kg/ha; sierteelt: 250-300 g/100L.
WAARSCHUWING: meng niet met producten waar zwavel in zit.

MEST OP BASIS VAN CALCIUM GEKOMPLEXEERD MET LSA, MET BOOR (B)
SAMENSTELLING: calciumoxide (CaO) oplosbaar in water: 20,0%; calciumoxide (CaO) gekomplexeerd met LSA: 20,0%; boor (B) oplosbaar in water: 0,5%. Het calcium, gekomplexeerd met LSA, is stabiel in het interval pH 3-9.
FORMULATIE: oplosbare microkristallen
Gebruik enkel bij erkende noodzaak. Verhoog niet de geschikte dosis.

Geproduceerd en verpakt door Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atezza (Chieti) Italy

foliar application, 잎의 응용 프로그램, 葉面噴施, уаpиcан тaтbиқ, фолијарна апликација, Blattapplikation, toepassing voor blad



한국어 | BREXIL Ca를 엽면 시비하면 칼슘 결핍을 예방하고 치료합니다. 착화제 LSA는 식물 독성의 위험 없이 최적의 칼슘 흡수를 보장합니다.
용법: 적용시기 및 용량: 엽면 시비 (7-14일마다): 유실수: 2.5-3 kg/ha, 채소 작물: 2.5-3 kg/ha, 공예 작물: 2.5-3 kg/ha, 관상용 작물: 250-300g/100L.
경고: BREXIL Ca와 유황 성분을 혼합하지 마십시오.
붕소(B) 함유 복합 칼슘 (암모니아 리그닌술폰산염)
조성: 수용성 산화 칼슘(CaO) 20.0%, LSA 복합 산화 칼슘(CaO) LSA는 20.0%, 수용성 붕소(B) 0.5%. LSA 복합 칼슘은 pH 3-9의 범위에서 안정적입니다.
제형: 가용성 미립자
제조사: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le - 66041 ATESSA (Chieti) Italy

中文 | Brexil Ca 作为叶面肥使用时,能防止和治疗作物的钙缺乏症状.螯合剂硫酸木质素 (LSA) 能促进钙的吸收.对作物非常安全.无药害风险.
使用方法: 施用时机和使用量: 叶面施用7-14天喷施一次.果树.2.5-3公斤/公顷.蔬菜.2.5-3公斤/公顷.工业原料作物.2.5-3公斤/公顷.观赏作物.稀释250-300克兑水 100 升水.
注意: 不要与含硫肥料混用
含硫酸木质素 LSA 螯合钙的微量元素肥料, 并含有硼 (B)
主要成份: 水溶性氧化钙 (CaO): 20.0%; 硫酸木质素 LSA 螯合的氧化钙 (CaO): 20.0%; 水溶性硼: 0.5% 硫酸木质素 LSA 螯合钙的稳定 pH 值在 3-9 之间
剂型: 水溶性微颗粒剂

制造和包装公司 Valagro S.p.A. - Zona Ind.le 66040 Atezza (Chieti) Italy

BREXIL Ca | Valagro® MADE IN ITALY



8 031702 016442



BREXIL Ca | Valagro® MADE IN ITALY

| BREXIL Ca

МАКЕДОНСКИ | BREXIL Ca ги СПРЕЧУВА И ГИ ЛЕКУВА НЕДОСТАТОЦИТЕ НА КАЛЦИУМ. КОМПЛЕКСНИОТ АГЕНТ LSA ОБЕЗБЕДУВА МАКСИМАЛНА ПЕНЕТРАЦИЈА и употреба на калциум без ризик од фитотоксичност.
НАЧИН И ДОЗИ НА УПОТРЕБА: Фолијарна (интервенции секои 7-14 дена): Овошни култури: 2.5-3 kg/ha; градинарски култури: 2.5-3 kg/ha; индустриски култури: 2.5-3 kg/ha; украини растенија: 250-300 g/100 L.
ПРЕДУПРЕДУВАЊА: Избегнувајте мешање со производи кои содржат сулфур.
ГУБИРВА НА БАЗА НА СЕКУНДАРНИ ЕЛЕМЕНТИ,
Комплекс на калциум (амониум лигносулфонат) со бор (B).
СОСТАВ: Калциум оксид (CaO) растворлив во вода 20.0%; калциум оксид (CaO) комплексен со 20.0% амониум лигносулфонат; бор (B) растворлив во вода 0.5%. Калциумот комплексиран со LSA е стабилен во интервал 3-9.
ФОРМУЛАЦИЈА: растворливи микрогранули.

Producers: Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atezza (Chieti) Italy

ภาษาไทย | การใช้น้ำยี้แคลเซียมชนิดทางใบช่วยป้องกันและรักษาการขาดแคลเซียมของพืชได้ และใช้แล LSA ยังช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กับพืชจากการเลี้ยงดอกที่เป็นพืชไร่และธัญญาหารไร่: ใช้ฉีดพ่นทางใบทุก 7-14 วัน โดยไม่ผล ใช้อัตรา 400-480 กรัม/ไร่, พืชผักและพืชผลสดทางกรร เช่น มันฝรั่ง มันสำปะหลัง และมะเขือเทศ ใช้อัตรา 400-480 กรัม/ไร่, ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้อัตรา 250-300 กรัม ผสมน้ำ 100 ลิตร
ข้อควรระวัง: ห้ามผสมน้ำยี้แคลเซียมชนิดทางใบนี้ร่วมกับปุ๋ยเคมี
ปริมาณธาตุอาหารของน้ำยี้: แคลเซียม (CaO) 20.0%, แคลเซียมที่เคล LSA 20.0%, โบรอน (B) 0.5%, แคลเซียมที่เคล LSA คงตัวในช่วง pH 3-9
ลักษณะ: เม็ดละลายน้ำ

ผู้ผลิต: VALAGRO S.p.a. Zona Ind.le – 66041 ATESSA (Chieti) ประเทศอิตาลี
Distributed in Thailand: บริษัท เคซีดีดี แอนด์โซลูชั่น จำกัด 715 ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน เขตคลองจั่น บางเขน กรุงเทพฯ 10510

AZƏRBAYCAN | BREXIL Ca aleyhina tədbirlər görməyi qarşısını alır. KOMPLEKS AŞAĞI LSA MAXIMUM PENETRASIYA QIYMƏTLI SAXLANIR və kalsiumun fitotoksiklik riski olmadan istifadəsi.
METOD VƏ İSTİFADƏ DOZASI: Bitkilər (hər 7-14 gündə amalyıyatlər): Meyvələr: 2.5-3 kq / ha, tərəvzilər: 2.5-3 kq / ha, səyayə: 2.5-3 kq / ha, ornamental: 250-300 g / 100L.
XƏBƏRDARLIQ: Kükürd olan məhsullarla qarışdırmaqdan çəkinin.
İKİ ELEMENTLƏR ÜZRƏ GÜBRƏLƏR.
Kalsium kompleksi (ammonium liqnosulfonat) Bor (B) ilə
KOMPOZİSIYA: Kalsium oksid (CaO) suda 20,0% hall edir; 20,0% ammonium liqnosulfonate ilə kompleksləşmiş kalsium oksid (CaO); Bor (B) suda 0.5% hall edir. LSA ilə kompleksləşmiş kalsium 3-9 intervalında sabitdir.
FORMULASIYA: hallolan mikroqranullar.

İstehsalç: VALAGRO S.p.A Sanayə zonası - 66041 Atezza (Chieti), İtaliya

4232973F85P157 02



www.valagro.com