



BREXIL Zn

5 Kg

net mass, 을 중량, неттоаустот, nettogewicht, 净重, net kütləsi, нето маса, netto gewicht

ENGLISH | BREXIL Zn is a product designed to prevent or correct Zn deficiency by foliar applications. Complexing agent LSA guarantees good uptake in leaves without any phytotoxicity problem.
DIRECTION FOR USE: foliar application (treatment every 7-14 days) Fruit crops: 1-2,5 kg/ha; vegetables: 1-1,5 kg/ha; ornamentals: 100-150 g/100 L; processing crops 1,0-2,5 Kg/ha.
WARNING: On peaches and kiwi fruit, do not treat after fruit has reached half of its expected size. A compatibility jar test must be conducted before mixing BREXIL Zn with products containing Calcium. In protected crops, do not exceed the rate of 150g/100 litres. Dissolve the product directly in the sprayer.
EC FERTILISER, Zinc complex (LSA)
COMPOSITION: Zinc (Zn) soluble in water 10,0%; zinc (Zn) complexed by LSA 10,0%. Zinc complexed by ammonium liginisulphonate (LSA) is stable in the pH range 3-8,5. **FORMULATION:** soluble microgranules
To be used only where there is a recognized need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Manufacturer Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distributed in new Zealand by: AGRITRADE, 1 Robin Mann Place Christchurch Airport Christchurch 8053
- New Zealand Telephone (03) 341 4587 - Fax (03) 341 4584 - Free Phone 0 800 333 855
Distributed in Australia by: Campbell's Fertilisers Australia Pty Ltd
18 Raymond Rd Laverton Nth, Melbourne, Victoria, Australia, 3026.
Phone: +613 9931 2211 - Fax: +613 9931 2201 Email: info@campbellsfert.com.au
Web: www.campbellsfert.com.au

한국어 | BREXIL Zn은 아연 결핍증을 치료하고 예방합니다. 착화제(LSA)는 최대 집투력을 보장하며

식물 독성의 위험이 없는 미량 영양소 사용
용법 및 용량: 연면 (7-14일마다 도포), 유실 작물: 1-2,5kg/ha, 원예 작물: 1-1,5kg/ha, 관상용: 100-150g/100L, 산업용: 1,0-2,5kg/ha. 경교: 복숭아와 대레나무의 경우, 과일이 반숙된 후에는 도포하지 않습니다. 칼슘계 제제와 혼합하기 전에 혼합성 테스트를 수행하십시오. 보호 작물에는 150g/100리터의 용량을 초과하지 마십시오. 제품을 분무기에서 직접 용해하십시오.
EC 비료, 아연 착화합물 (LSA)
조성: 수용성 아연 (Zn) 10,0%, LSA 10,0%와 착화합물을 형성하는 아연 (Zn), LSA와 착화합물을 형성하는 아연은 3-8,5의 pH 범위에서 안정적입니다.
제형: 가용성 미립자
필요한 경우에만 사용하십시오. 권장 용량을 초과하지 마십시오.
유기 농업에 허용됨
원재료: 황산 아연, 암모늄 리그노술포네이트

제조사: Valagro Spa - Industrial Zone, Atessa (Chieti) 66041 Italy

DEUTSCH | BREXIL Zn behebt und beugt Zinkmangel vor. Der komplexierte Wirkstoff (LSA) gewährleistet bei die maximale Eindringung und Nutzung des zink ohne jegliches Phytotoxizitätsrisiko.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG: blattpflanzen (tägliche Anwendung für 7-14 Tage) Obstpflanzen: 1-2,5 kg/ha; Gemüsepflanzen: 1-1,5 kg/ha; Industriepflanzen: 1-2,5 kg/ha; Zierpflanzen: 100-150 g/100L.
HINWEISE: Bei Verwendung mit Produkten auf Calziumbasis ist ein Mischbarkeitstest durchzuführen. Steinobst und Kiwi nicht nach der halben Fruchtveredlung behandeln. Bei geschützten Kulturen die Dosierung von 150g/100l nicht überschreiten. Produkt direkt im Zerstäuber auflösen.
EG-DÜNGEMITTEL, Zinkkomplex (LSA)
ZUSAMMENSETZUNG: wasserlösliches Zink (Zn): 10,0%; zink (Zn) Komplex von LSA: 10,0%. Komplexierter Zink mit LSA (Ammonium-Ligninsulfat) ist im pH-Intervall 3-8,5 stabil.
FORMULIERUNG: lösliche Mikrokristalle
Nur im echten Bedarfsfall verwenden. Nicht überdosieren.

Hersteller: Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atessa (Chieti) Italy

МАКЕДОНСКИ | BREXIL Zn ги лекува и ги спречува недостатоците на цинк. Сложениот агенс LSA обезбедува максимална пенетрација и употреба на микроелементи без ризици од фитотоксичност
НАЧИН И ДОЗИ НА УПОТРЕБА: фолијарно (апликации на секои 7-14 дена). Овошни култури: 1-2,5 kg/ha; хортикултурни растенија: 1-1,5 kg/ha; украсни растенија: 100-150 g/100 L; индустриски растенија: 1,0-2,5 kg/ha.
ВНИМАНИЕ: На праски и киви да не се третира откако овошјето е полу-зрело. Пред мешање со производи на базирани на калциум, направете тест со мешање. Во заштитена култура не ја надминувајте дозата од 150 g/100 литри. Растворете го производот директно во распрснувачот.
ЕУ ГУБРИВО, Комплекс на цинк (LSA)
СОСТАВ: Цинк (Zn) растворлив во вода 10,0%; Цинк (Zn) сврзан со LSA 10,0%. Цинкот сврзан со LSA е стабилен во pH интервалот од 3-8,5.
ФОРМУЛАЦИЈА: растворливи микрогранули
За употреба само во случај на утврдена потреба. Да не се надминуваат соодветните дози.

Производители: Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atessa (Chieti) Imanuja

foliar application, 잎의 응용 프로그램, 葉面噴施, уаpиcан тaтbiq, фолијарна апликација, Blattapplikation, toepassing voor blad



Valagro
Where science serves nature

BREXIL Zn

Warning H319 Causes serious eye irritation. H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. P273 Avoid release to the environment. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P391 Collect spillage. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations. Contains: zinc sulphate. NZ POISON CENTRE CONTACT: 0800 764 766 (National Poisons Information Centre) classification(s) to display Manufacturer: VALAGRO S.p.A. Zona Industriale, 66041 Atessa (Ch), Italy - Phone: (+39) 0872 / 8811 www.valagro.com. Distributed in NZ By: AGRITRADE 411 Blairheim Rd Sockburn Christchurch 8140 Ph 03 341 4587 Fax 03 341 4584 Free Phone 0800 333 855

Achtung H319 Verursacht schwere Augenreizung. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P264 Nach Gebrauch mit Wasser und Seife gründlich waschen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser P337+P313 spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt/Behälter/Behälterreste in Übereinstimmung mit den Vorschriften. Enthält: Zinksulfaat.

Let op H319 Verorzaak ernstige oogirritatie. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/geelantsbescherming dragen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P391 Gelekte/gemorstte stof opruimen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met de wetten. Bevat: zinksulfaat.

警告 H319 造成严重眼刺激 H410 对水生生物毒性 极大并具 有长期 持续影响 P273 避免释放到环境中。P280 戴防护手 套/穿防护 服/戴防护眼镜/戴 防护面具。P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水 小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并 不方便取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。P337 + P313 如 仍觉 眼刺激：求医/就诊 P391 收集溢出物 P501 处置内装物/容器 根据法律。

Net mass, 을 중량, неттоаустот, nettogewicht, 净重, net kütləsi, нето маса, netto gewicht: 5 kg

Manufacturer, 제조사, Hersteller, Производители, Өндүрүшчү, Fabrikant, Ištehalci, 製造工廠: VALAGRO S.p.A. Zona Industriale, 66041 ATESSA (Ch) ITALY. Tel. (+39) 0872 / 8811

LF: YMDG-W06K-Q90M-Y4ER

BREXIL Zn | Valagro MADE IN ITALY



8 031702 016596



BREXIL Zn

ภาษาไทย | BREXIL Zn เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดธาตุสังกะสีโดยมีบทบาทในการลดการขาดธาตุสังกะสี LSA ช่วยทำให้ต้นพืชได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีพิษต่อพืช
วิธีการใช้: ฉีดพ่นทางใบ (สัปดาห์ 7-14 วัน) ผลไม้: 1-2,5 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์; พืชผัก: 1-1,5 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์; ไม้ประดับ: 100-150 กรัม / 100 ลิตร; พืชผลัดใบตามฤดูกาล: 1,0-2,5 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์
คำเตือน: สำหรับทุเรียนและมะม่วง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ร่มเงาหรือบริเวณที่ลมแรง การทดสอบสารผสมเป็นสิ่งจำเป็นก่อนใช้
ข้อมูลความปลอดภัยและสุขภาพ: BREXIL Zn ปลอดภัยทั้งกับคนและสัตว์ ใบพืชที่ได้รับสารจะคงอยู่ได้นาน 150 วัน / 100 ลิตร และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
เป็น EC ฆ่าเชื้อและสังกะสี (LSA)
องค์ประกอบ: สังกะสี (Zn) ละลายในน้ำ 10,0%; สังกะสีที่สังกะสี (Zn) โดย LSA 10,0% สังกะสีสังกะสี (Zn) ที่สังกะสีสังกะสีสังกะสี (LSA) มีความเสถียรในช่วง pH 3-8,5
สูตร: เนื้อหาออกซิเจนสังกะสี 10
สถานที่ในอินเดียมีจำหน่ายที่: Valagro S.p.A. - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

NEEDERLANDS | BREXIL Zn geneest en voorkomt gebrek aan zink. Het complexvormende middel LSA geeft gegarandeerd de maximale doordringing en opname van zink, zonder enkel risico voor plantvergiftiging.
DOSISSEN EN GEBRUIKSAANWIJZING: voor bladeren (behandeling elke 7-14 dagen). Fruitbomen: 1-2,5 kg/ha; groente-teelt: 1-1,5 kg/ha; sierteelt: 100-150 g/100 L; industriële gewassen: 1,0-2,5 kg/ha.
WAARSCHUWING: doe mengproeven voor gebruik met producten op basis van calcium. Dupacite en actinidia (zoals kiwi) moeten niet behandeld worden als de vruchten al voorbij halve grootte zijn. In beschermde omgevingen niet meer gebruiken dan 150 g/100 L. Los het middel direct in de verstuiver op.
EG-MESTSTOF, Zinkcomplex (LSA)
SAMENSTELLING: Zink (Zn), oplosbaar in water: 10,0%; zink (Zn) complexvormer LSA: 10,0%. Het met LSA gekomplexeerde zink (ammoniak-ligninsulfonaat) is stabiel in het pH interval: 3-8,5. Alleen te gebruiken in geval van duidelijk behoefte. De benodigde doses niet overschrijden.
Fabrikant Valagro Spa - Zona Ind.le 66041 Atessa (Chieti) Italy

AZƏRBAYCAN | BREXIL Zn sink çatışmazlığını müalicə edir və qarşısını alır. KOMPLEKS AŞAĞI LSA MAXIMUM PENETRASIYA QIYMƏTLİ SAXLANIR BİTKİ TOXUMASI RİSKİ OLMADAN mikro-qida maddələrindən istifadə
YOL TƏTBİQİ VƏ TƏTBİQ QOŞULMASI: foliar (müddəklər hər 7-14 gün). Meyvələr: 1-2,5 kq / ha. Bağ məhsulları: 1-1,5 kq / ha; ornamental: 100-150 g / 100 L; sanayi: 1,0-2,5 kq / ha. **XƏBƏRDARLIQ:** Saftalı və Actinidia 'da yarım meyvə gənəcləndirilməsi sonrası müalicə etmir. Məhsullarla qarışmadan əvvəl futbol bir qarğırdma testini həyata keçirin. Qorunan mədəniyyətdə **Gübrə Sink Kompleksi (LSA)**
KOMPOZİTSİYONU: Sink (Zn) suda 10,0% həll edir; Sink (Zn) LSA 10,0% ilə kompleksləşdirilir. LSA ilə kompleks sinkdir 3-8,5 pH aralığında sabitdir.
FORMULASIYA: həll olan mikroqranullar
Yalnız tanınmış ehtiyac halında istifadə üçün. Müvafiq dozaları aşmayın.

Ištehalci: Valagro Spa - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italya

中文 | 锌元素
1. 肥料登記證字號: 肥康 (備) 字第0068078號
2. 肥料品目: 4-3 聯合態錳肥料
3. 商品名稱: 锌元素
4. 登記成分: 水溶性錳 10,0%
5. 包裝淨重: 1公斤
6. 使用方法: 葉面噴佈 (每隔7-14天) 果樹: 100-250公克 / 一百公升水 蔬菜及花卉: 100-150公克 / 一百公升水 加工作 物: 2-2,5公斤 / 公頃
7. 製造工廠: Valagro S.p.A. 法拉格羅公司
Zona Industriale, Atessa 66040 Chieti / Italy
義大利普地省皮爾察諾市66040奧那工業區
8. 輸入業者: 應群實業有限公司 台北市建國北路二段112號4樓
9. 製造日期: 請覓包裝標示
10. 批 發: 請覓包裝標示
11. 有效期間: 三年

4128573F85P1S7 01



www.valagro.com